

# Floranid® Twin NK 14-0-19(+3)



## Rasendünger & Langzeitdünger

Spezial-Langzeitdünger ohne Phosphat für Kulturen im Öffentlichen Grün, Landschaftsbau, Gartenbau und Baumschulen. Enthält die Doppel-N-Technologie ISODUR® und CROTODUR®.

- Mit der Doppel-N-Technologie ISODUR® und CROTODUR®
- Langzeitdünger ohne Phosphat
- Günstig für dein Einsatz auf sorptionsschwachen und kali- bzw. magnesiumarmen Standorten
- Setzt sich dosiert je nach Witterungsverlauf voll pflanzennutzbar über mehrere Monate frei
- Arbeitsaufwand, Anwendungsrisiko und Nährstoffverluste durch Auswaschung werden verringert
- Auch für die Düngung beim Einsatz von Mährobotern empfehlenswert

## Beschreibung

Floranid®Twin NK ist ein NK-Dünger mit Isobutylidendiarnstoff (ISODUR®) und Crotyldendiarnstoff (CROTODUR®), mit Kupfer, Eisen, Mangan, Zink.

In den Floranid<sup>®Twin</sup>-Düngern sind die beiden Stickstoffkomponenten ISODUR<sup>®</sup> und CROTODUR<sup>®</sup> mit ihren jeweiligen Stärken in einem optimalen Verhältnis formuliert und ideal aufeinander abgestimmt.

Das ISODUR<sup>®</sup>-Molekül wird überwiegend über das Prinzip der Hydrolyse umgewandelt und startet seine sukzessive Stickstofffreisetzung auch bereits bei relativ kühlen Temperaturen. Die Langzeitwirkung des stabilen Ring-Moleküls CROTODUR<sup>®</sup> hingegen basiert zu einem großen Teil auf mikrobieller Umsetzung und korreliert somit auch enger mit dem die Mikroorganismenaktivität beeinflussenden Faktor Temperatur. Die Kombination von ISODUR<sup>®</sup> und CROTODUR<sup>®</sup> ermöglicht somit also auch bei indifferenten Wetter- bzw. Temperaturverhältnissen eine sichere, kontinuierliche und nachhaltige Stickstoffverfügbarkeit.

Floranid<sup>®Twin</sup> NK wurde speziell entwickelt zur Langzeitdüngung auf Böden mit hohen bis sehr hohen Phosphatgehalten. Es ermöglicht eine kulturgerechte Nährstoffvollversorgung und gleicht Nährstoffungleichgewichte im Boden aus. Kultur- und standortspezifische Ansprüche lassen sich durch Kombination mit den Langzeitdüngern aus der Floranid<sup>®Twin</sup>- Linie oder aus dem Basatop<sup>®</sup>- Sortiment exakt einstellen. Die hohen Kali- und Magnesiumgehalte sind günstig für den Einsatz auf sorptionsschwachen und kali- bzw. magnesiumarmen Standorten. Wichtig ist auch der hohe Gehalt an allen wichtigen Spurennährstoffen die im Floranid<sup>®Twin</sup> NK enthalten sind. Der Langzeitstickstoff aus ISODUR<sup>®</sup> und CROTODUR<sup>®</sup> wird dosiert und pflanzenschonend im Laufe vieler Wochen freigesetzt und voll pflanzennutzbar. Die Wirkungsdauer beträgt je nach Witterungsverlauf ca. 3 Monate. Dadurch werden Arbeitsaufwand, Anwendungsrisiko und Nährstoffverluste durch Auswaschung verringert. Floranid<sup>®Twin</sup> NK ist ein Langzeitdünger mit breitem Einsatzbereich im Öffentlichen Grün/Landschaftsbau, Erwerbsgartenbau und in Baumschulen.

Floranid<sup>®Twin</sup> NK ist auch beim Einsatz von Mährobotern empfehlenswert und wirkt gleichmäßig und über einen längeren Zeitraum ohne ein starkes Massenwachstum zu generieren. Die enthaltenen Nährstoffe regen das mikrobielle Bodenleben an und unterstützen so den Abbau bzw. Mineralisation des anfallenden Schnittgutes. Die Aufwandmengen können hierbei leicht reduziert werden, jedoch sollte die Anzahl des Düngetermine pro Jahr erhalten bleiben. Auf regelmäßiges Vertikutieren und gegebenenfalls Aerifizieren ist zu

**EXPERTS FOR GROWTH**



achten.

## Deklaration

EU-Düngeprodukt\*

Mineralisches Düngemittel - PFC 1(C)(I)(a)(ii)

NK (MgO, SO<sub>3</sub>) Komplex Düngemittel 14-0-19 (+3+33,75) mit Spurennährstoffen

Für die Anwendung im Gartenbau.

chloridarm

Inhalt	Nährstoff	
14,0 %	N	Gesamt-Stickstoff 2,6 % Nitratstickstoff 6,4 % Ammoniumstickstoff 3,0 % Isobutylidendiharnstoff 2,0 % Crotonylidendiharnstoff
19,0 %	K <sub>2</sub> O	wasserlösliches Kaliumoxid
3,0 %	MgO	Gesamt-Magnesiumoxid 2,4 % wasserlösliches Magnesiumoxid
33,75 %	SO <sub>3</sub>	Gesamt-Schwefeltrioxid (13,5 % S) 32,5 % wasserlösliches Schwefeltrioxid (13,0 % S)
0,01 %	Cu	wasserlösliches Kupfer, als Kupferdinatrium, 100 % chelatisiert durch EDTA
0,50 %	Fe	Gesamt-Eisen, als Sulfat, davon 0,2 % wasserlösliches Eisen
0,10 %	Mn	wasserlösliches Mangan, als Sulfat

Inhalt	Nährstoff	
0,01 %	Zn	wasserlösliches Zink, als Sulfat

Chelatisierte Nährstoffe sind im pH-Bereich 4-8 stabil.

Nur bei anerkanntem Bedarf anwenden. Aufwandmengen nicht überschreiten.

**Lagerbedingungen und -hinweise:**

Schützen Sie gelagerten Dünger vor Frost, Licht, hohen Temperaturen und Feuchtigkeit. Vermeiden Sie große Temperaturschwankungen. Stapeln Sie nicht mehr als zwei Paletten. Nur in der Originalverpackung lagern. Nach dem Öffnen schnell verbrauchen.

**Informationen zu Sicherheit und Umwelt:**

Um Risiken für Mensch und Umwelt zu vermeiden, befolgen Sie bitte die Gebrauchsanweisung für dieses Produkt.

EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Gefahrstoffverordnung: Düngemittel mit Ammoniumnitrat Gruppe C III

**Schüttgewicht:** ca. 860 kg/m<sup>3</sup>

**Korngröße:** Granulat, 90 % < 2,8 mm

**Allgemeine Informationen: FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH**

\* Nach EU-Düngeprodukteverordnung (Verordnung (EU) 2019/1009)

## Anwendungsempfehlungen

### Garten- und Landschaftsbau

#### Anwendung

Granulierte Düngung

#### Anwendungsfrequenz

Nach Empfehlung

#### Aufwandmenge

##### **Grunddüngung Gehölze, Bodendecker**

60-80 g/m<sup>2</sup> je Gabe (6-8 kg/100m<sup>2</sup>), 1 Gabe

#### Anwendungszeitraum

Zur Pflanzung

##### **Grunddüngung Einjahresblumen, Stauden**

40-60 g/m<sup>2</sup> je Gabe (4-6 kg/100m<sup>2</sup>), 1 Gabe

Zur Pflanzung

##### **Pflegedüngung Einjahresblumen, Stauden**

40-60 g/m<sup>2</sup> je Gabe (4-6 kg/100m<sup>2</sup>), 1-2

Gaben

Zur Pflanzung

##### **Pflegedüngung Rosen, Ziersträucher**

60-80 g/m<sup>2</sup> je Gabe (6-8 kg/100m<sup>2</sup>), 1-2

Gaben

April-Juni

## Rasen & Öffentliches Grün

### Anwendung

Granulierte Düngung

### Anwendungsfrequenz

Nach Empfehlung

### Aufwandmenge

**Rasenflächen öffentliche Grünflächen, Parks:**

40-50 g/m<sup>2</sup> je Gabe (4-5 kg/100m<sup>2</sup>), 1-2

Gaben

### Anwendungszeitraum

März-Juni

**Rasenflächen Spiel- und Bolzplätze:**

40-60g/m<sup>2</sup> je Gabe (4-6 kg/100m<sup>2</sup>), 1-2

Gaben

März-August

## Golfrasen

### Anwendung

Granulierte Düngung: Fairways

### Anwendungsfrequenz

2-3 Gaben

### Aufwandmenge

40-60 g/m<sup>2</sup> je Gabe

4-6 kg/100m<sup>2</sup> Streumenge

### Anwendungszeitraum

März-November

## Sportrasen

### Anwendung

Granulierte Düngung: Rasensportplätze

### Anwendungsfrequenz

1 Gabe

### Aufwandmenge

40-60 g/m<sup>2</sup> je Gabe

4-6 kg/100m<sup>2</sup> Streumenge

Rasenregeneration in Kombination mit 70-150  
g/m<sup>2</sup> Agrosil LR

### Anwendungszeitraum

Mai-Juli

## Schnittblumen

### Anwendung

Granulierte Düngung

### Anwendungsfrequenz

Nach Empfehlung

### Aufwandmenge

#### Chrysanthemen:

10 kg/100m<sup>2</sup> je Gabe, 2 Gaben/Jahr

### Anwendungszeitraum

Nach Empfehlung

#### Nelken

10 kg/100m<sup>2</sup> je Gabe, 3-4 Gaben/Jahr

Nach Empfehlung

#### Rosen

7 kg/100m<sup>2</sup> je Gabe, 3-4 Gaben/Jahr

Nach Empfehlung

#### Freesien

10-12 kg/100m<sup>2</sup> je Gabe, 1 Gabe/Jahr

Nach Empfehlung

## Zierpflanzenbau und Baumschule

### Anwendung

Granulierte Düngung: Baumschulkulturen auf  
Anzuchtflächen

### Anwendungsfrequenz

Nach Empfehlung

### Aufwandmenge

3-5 kg/100m<sup>2</sup> je nach Sortenanspruch

### Anwendungszeitraum

Nach Empfehlung

Der phosphatfreie Langzeitdünger Floranid® Twin NK kann sowohl von Hand als auch mit Streugeräten gut und gleichmäßig ausgebracht werden. Er wird zur Grunddüngung (bei sehr hohen Phosphatgehalten) und zur Pflegedüngung bei Kulturen aller Art eingesetzt. Bei den empfohlenen Aufwandmengen besteht keine Verbrennungsgefahr. Eine Beregnung nach der Anwendung fördert die Sofortwirkung. Bei empfindlichen Pflanzen, z. B. im Gartenbau, sollte darauf geachtet werden, dass keine Körner auf den Blättern liegenbleiben.

## Lieferform

- 25 kg Kunststoffsack

## Transport & Lagerhinweise

### Transport

- Die Auslieferung erfolgt als lose Ware, in Big Bags oder auf Paletten mit Säcken und Kanistern.
- Lose Ware unbedingt vor Feuchtigkeit während des gesamten Transportes schützen.
- Beim Transport vor zu starker Sonneneinstrahlung und hohen Temperaturschwankungen schützen.
- Nur bei gemäßigten Temperaturen transportieren. Bei Bedarf einen klimatisierten LKW benutzen.
- Beachten Sie die gefahrgutrechtlichen Kennzeichnungen auf dem Produkt.

### Lagerung

- Den Dünger frostfrei, lichtgeschützt und trocken lagern.
- Lose Ware innerhalb eines Gebäudes und nicht auf Außenflächen lagern. Türen geschlossen halten und das Haufwerk abdecken.
- Da das Produkt dazu neigt Feuchtigkeit zu ziehen, vor Regen und Staunässe schützen.
- Beachten Sie die produktspezifischen Hinweise.
- Paletten und Big Bags nicht stapeln, da es durch die mechanische Belastung zu Verbackungen kommen kann. Nur in der Originalverpackung lagern. Angebrochene Verpackungen schnellstmöglich aufbrauchen.
- Falls zutreffend, beachten Sie die gefahrgutrechtlichen Kennzeichnungen auf dem Produkt.

## **Lagertemperatur**

- Frost und zu hohe Temperaturen vermeiden.
- Starke Temperaturschwankungen bei der Lagerung vermeiden

## **Lagerzeitraum**

- Geöffnete Verpackungen sollten schnellstmöglich aufgebraucht werden.